

FASTE P-GLUCOSE

Formålet med undersøgelsen

Måling af faste P-Glucose (blodsukker) udføres først og fremmest ved mistanke om sukkersyge (diabetes mellitus). Faste P-Glucose vil være unormalt forhøjet ved sukkersyge.

Forberedelse

- Der må ikke være indtaget føde eller andre drikke end 1-2 glas vand siden kl. 22 aftenen før prøvetagning.
- Livsvigtig medicin bør dog tages som sædvanlig, medmindre andet aftales med lægen.
- Der må ikke ryges tobak eller tygges tyggegummi i de sidste 2 timer før prøvetagning.
- Prøvetagning bør ske om morgenen/formiddagen.
- I 3 dage op til undersøgelsen skal du spise normal kost og ikke være på diæt. Også hvis du er på ordineret diæt, skal du holde pause med diæten, indtil undersøgelsen er udført.

Undersøgelsen

- Der tages blodprøve fra en blodåre i albuebøjningen til måling af faste P-Glucose.

Svar på undersøgelsen

- Du får sædvanligvis svar på undersøgelsen ved næste ambulante besøg. Hvis du er indlagt, får du svar ved stuegang, så snart svaret foreligger. Evt. kan afdelingen aftale et andet tidspunkt for svarafgivelse med dig.