

## **CALPROTECTIN I FÆCES (AFFØRING) - PATIENTVEJLEDNING**

### **Formålet med undersøgelsen**

Formålet er at bestemme indholdet af calprotectin i din afføring (= calprotectin i fæces).

Ved inflammatoriske tarmsygdomme stiger calprotectin niveauet kraftigt i fæces.

Du skal derfor opsamle en prøve af din afføring i det udleverede prøverør, for at vi kan undersøge om calprotectin indholdet er for højt.

### **Forberedelse**

Du må spise og drikke, som du plejer og indtage din sædvanlige medicin.

### **Sådan foregår opsamlingen**

- Skru det brune låg af det udleverede prøverør der er mærket med dit navn og CPR nummer
- 1 - 5 gram (en klump på størrelse med en ært) frisk afføring opsamles med den fastmonterede ske i låget på prøverøret
- Afføringen må ikke være blandet med urin
- Låg med ske og prøvemateriale placeres i prøverøret og låget skrues helt fast
- **Skriv dato på navnemærkaten på prøverøret**
- Prøverøret placeres i det hvide forsendelsesrør, der lukkes
- Prøven afleveres til afdelingens personale, som sørger for videreforsendelse til Klinisk Biokemisk Afdeling

### **Svar på undersøgelsen**

Du får sædvanligvis svar på undersøgelsen ved næste ambulante besøg eller, hvis du er indlagt, ved stuegang, så snart svaret foreligger. Evt. laver afdelingen en anden aftale med dig.