

ACTH-TEST (SYNACTHEN-TEST) (BINYRE-CORTISOL PRODUKTION TEST)

Formålet med undersøgelsen

Du skal have foretaget en ACTH-test (Synacthen-test), d.v.s. en undersøgelse af binyrernes evne til at danne hormoner. En nedsat eller manglende dannelse af binyrebarkhormoner ses ved visse sygdomme og efter langvarig behandling med binyrebarkhormon.

Forberedelse

- Du må spise og drikke som du plejer og tage din sædvanlige medicin. Dog må du **ikke** indtage medicin, som indeholder binyrebarkhormon som fx. Prednisolon eller Prednison. Tal med den læge som har bestilt undersøgelsen om aftrapning eller skift til anden medicin før undersøgelsen.

Undersøgelsen

- Der tages en blodprøve, hvorefter der indsprøjtes et stof, som får binyrerne til at danne hormon. Der tages en blodprøve igen en halv time senere. Undersøgelsen varer knap en 1 time i alt. Enkelte mærker en let varmekøbsfølelse efter indsprøjtning af det binyrestimulerende hormon.

Svar på undersøgelsen

- Du får sædvanligvis svar på undersøgelsen ved næste ambulante besøg eller, hvis du er indlagt, ved stuegang, så snart svaret foreligger. Evt. laver afdelingen en anden aftale med dig.