

J01FF01	CLINDAMYCIN Dalacin, Clindamycin (Abcur, Navamedic, Kalceks)				Pædiatri
Indikation	Vejledende dosis				
Alvorlige infektioner forårsaget af clindamycin følsomme bakterier	10 mg/kg pr. dosis x 3 dagligt Maks dosis 600 mg pr. dosis				
Styrke	Initialopløsning	Fortynding	Administration	Holdbarhed	Kommentarer
6 mg/ml brugsklar infusionsvæske, infusionspose*,**		Brugsklar infusionsvæske (6 og 12 mg/ml) gives ufortyndet ****	IV infusion: 0-600 mg: over 30 minutter	Ampul: Engangsbrug	Obs! Tromboflebit
Koncentration: 6 mg/ml		Infusionskoncentrat (150 mg/ml) skal fortyndes Fortyndingsvæske: NaCl 9 mg/ml eller glukose 50-100 mg/ml Max koncentration 18 mg/ml	Vægt > 90 kg: Max 30 mg/minut	Åbnet infusionspose: Engangsbrug	Kan give hypotension og hjertestop ved for hurtig infusion
12 mg/ml bruksklar infusionsvæske, infusionspose *,**			Dog max 20 mg/kg/time	Fortyndet opløsning: 12 timer ved stuetemperatur 24 timer i køleskab	Kan give mavesmerter, kvalme, opkast og diarre.
Koncentration: 12 mg/ml					
150 mg/ml inf. koncentrat, ampul***					
Koncentration: 150 mg/ml					
Supplerende oplysninger *Obs diabetikere: Lægemidlet indeholder glukose. **Infusionskoncentrat 150 mg/ml indeholder benzylalkohol som kan give alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år. Brugsklare infusionsvæsker anbefales. *** Dalacin 150 mg/ml infusionskoncentrat indeholder benzylalkohol, som kan give alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år. Clindamycin (Abcur, Navamedic, Kalceks) 150 mg/ml eller færdigblandede infusionsvæsker anbefales til børn over 12 år. ****For at undgå overdosering: Opsæt ikke et større volumen af lægemidlet end det, der er nødvendigt for at give ordineret dosis.					
Kan løbe i sidedrop med: NaCl 9 mg/ml, glukose 50-100 mg/ml og blandinger af disse, evt. tilsat op til 30 mmol KCl /liter.					
IV-vejledninger til børn		Senest ændret: 04.05.2026		Version: 1.0	

Forslag til fortynding af Clindamycin			Barn
Fortyndes til:	Clindamycin 150 mg/ml	Fortyndingsvæske	
6 mg/ml	1 del	24 dele	
10 mg/ml	1 del	14 dele	
15 mg/ml	1 del	9 dele	
Fortynding til andre koncentrationer			
Ved fortynding til andre koncentrationer end angivet i tabellen kan den ordinerede dosis blandes i en valgfri mængde fortyndingsvæske under hensyntagen til barnets vægt, væskestatus og praktiske forhold, så længe at 1 del clindamycin 150 mg/ml fortyndes med mere end 7,5 dele fortyndingsvæske.			

Forslag til fortynding af Clindamycin			Nyfødt
Fortynding til:	Totalvolumen	Clindamycin 150 mg/ml	Fortyndingsvæske
1,5 mg/ml	100 ml	1 ml	99 ml
6 mg/ml	25 ml	1 ml	24 ml
10 mg/ml	15 ml	1 ml	14 ml
15 mg/ml	10 ml	1 ml	9 ml

☒ = Markerede fortyndinger er implementerede i Sundhedsplatformen i Region Øst

Ansvarsfraskrivelse

Der er anvendt størst mulig omhu ved indsamlingen og bearbejdningen af iv-vejledningerne, men arbejdsgruppen kan ikke påtage sig et ansvar for indholdet af oplysningerne eller for anvendelsen af dem. Hvis der konstateres faktiske fejl i oplysningerne, vil disse selvfølgelig blive rettet hurtigst muligt.

Referencer

www.produktresume.dk

<https://www.legemidlertilbarn.no/blandekort>

Dosis og indikation jf. Produktresumé