



Patientinformation – Undersøgelse for blodprop i benet på Bispebjerg Hospital

Din praktiserende læge mistænker, at dine symptomer fra benet kan skyldes en blodprop. Derfor skal du hurtigst muligt have foretaget en ultralydsskanning (UL) af benet på hospitalet.

Direkte tidsbestilling til UL foregår ved at:

- **Din læge sender en elektronisk henvisning til Røntgenafdelingen**
og
- **Din læge ringer til Røntgenafdelingen på Bispebjerg Hospital, mens du er til stede**

Direkte tidsbestilling på Røntgenafdelingen kan kun foregå kl. 08.00-13.00 på hverdage. Du får tid til UL samme dag og skal være forberedt på at møde op indenfor kort tid (der kan være ledig tid indenfor 1 time)

Sådan vil undersøgelsen foregå

Ultralydsskanning foregår ved at et lydhoved bliver ført hen over hudoverfladen med et let pres, for at få bedst mulige billeder. Der er normalt intet ubehag forbundet med selve skanningen.

Hvis skanningen viser du har en blodprop vil Røntgenafdelingen sende dig direkte i Akutmodtagelsen eller Hjerterafdelingen på Bispebjerg Hospital, hvor du skal tale med en læge, der vil lægge en plan for din behandling.

Hele dette forløb forventes at tage samlet 3-4 timer, hvorefter du kan komme hjem igen. Der kan ved travlhed være yderligere ventetid.

Hvis der ikke er tegn på blodprop i benet, sender Røntgenafdelingen dig hjem igen. Du skal i det tilfælde, kontakte din læge dagen efter, hvor I aftaler eventuel opfølgning.

Hvis du herefter fortsat har smerter/hævelse af benet, kontakt din læge igen, som tager stilling til om du eventuelt skal skannes igen efter 7-10 dage.

Hvad er en blodprop i benet?

En blodprop i benet kaldes også en dyb venetrombose og forkortes DVT. Blodproppen sidder i de blodkar (vener) der fører blodet tilbage til hjertet.

[Skriv her]


Hvis du har en blodprop i benet

Behandlingen vil bestå i blodfortyndende medicin samt anvendelse af en kompressionsstrømpe (stram strømpe). Hvis det viser sig, at du har en blodprop i benet, vil du modtage mere information på hospitalet om det videre forløb og behandlingen.

Du skal være opmærksom på

I meget sjældne tilfælde kan en del af blodproppen i benet løsrive sig og sætte sig fast i lungerne. Du skal derfor være opmærksom på følgende:

- Hvis du pludselig bliver stakåndet
- Hvis du får svært ved at trække vejret
- Hvis du hoster mere end normalt
- Hvis du får ondt eller det strammer i brystkassen



Kilde: Sundhed.dk (Birgitte Lerche-Barlach 2018)

En blodprop i lungerne kan være alvorlig. Søg derfor akut lægehjælp.

Adresser:

Ultralydsundersøgelsen på Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital:

Røntgenafdelingen
Bispebjerg Hospital
Indgang 7A, 2. sal
Nielsine Nielsens Vej 41A
2400 København NV

Behandling i Akutafdelingen, Bispebjerg Hospital:

Akutmodtagelse
Indgang 7E, stuen
Nielsine Nielsens vej 41E
2400 København NV

Behandling i Hjerterafdelingen, Bispebjerg Hospital:

Hjerterafdelingens sengeafsnit Y21 (ambulant Y21A)
Indgang 60, 1. sal
Ebba Lunds Vej 44
2400 København NV