

ANTIDOTOVERSIGT

Indholdsstof	Handelsnavn	Anvendelse	Styrke	Lægemiddelform	Enhed	Opbevaring	Minimal beholdning	Placering ^{II)}	Mindste pakningsstørrelse	Solvens til inj. eller inf.
Acetylcystein	Acetylcystein	Paracetamol	200 mg/ml	Konc. til inf. væske	Htgl. 50-100 ml	Stuetemperatur	300 ml; Antal enheder afhænger af htgl. volumen	Basis	1 x 100 ml	Glucose 50 mg/ml eller NaCl 9 mg/ml
Aktivt kul	Carbomix m.fl.	Adsorption af gift	-	Granulat til oral suspension	Plastflaske 50 g	Stuetemperatur	10 plastflasker	Basis	1 x 50 g	Postevand
Antidigitalis Fab-fragment	DigiFab *)	Digitalisglykosider	40 mg	Infektionssubstans	Htgl. 40 mg	Køleskab	20 htgl.	Special	1 x htgl. à 40 mg	Sterilt vand
Atropin	Atropin SAD	Acetylcholinesterase-hæmmere (AChE-inhib.)	1 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 1 ml og 3 ml	Stuetemperatur	10 amp. à 1 ml og 30 amp. à 3 ml	Basis	10 x 1 ml og 10 x 3 ml	
	Atropin Skanderborg	Acetylcholinesterase-hæmmere (AChE-inhib.)	1 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 10 ml	Stuetemperatur	100 amp. à 10 ml	Supplering	5 x 10 ml	
	Atropinsulfat-100 mg *	Acetylcholinesterase-hæmmere (AChE-inhib.)	10 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 10 ml	Stuetemperatur	10 amp. à 10 ml	Supplering	5 x 10 ml	
Biperiden	Akineton	Medikamentelt udløste ekstrapyramidale symptomer	5 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 1 ml	Stuetemperatur	5 amp.	Basis	5 x 1 ml	
Botulinum antitoxin §)		Botulisme						SSI		
Calciumgluconat	Calgonate **)	Flussyre, hud	2,5 %	Gel	Tube 25 g	Stuetemperatur	4 tuber	Basis	1 x 25 g	
Calciumsalte, til IV og til oral brug	Calciumchlorid SAD ELLER Calciumgluconat	Calciumantagonister, flussyre, oxalsyre	0,5 mmol Ca ²⁺ /ml ELLER 0,23 mmol Ca ²⁺ /ml	Infektionsvæske	Amp. 10 ml	Stuetemperatur	5 amp. ELLER 10 amp.	Basis	10 x 10 ml ELLER 20 x 10 ml	
	Calcium-Sandoz® m.fl.	Calciumantagonister, flussyre, oxalsyre	12,5 mmol Ca ²⁺ /tbl	Brusetablet	20 brusetbl. a 500 mg	Stuetemperatur	20 brusetbl.	Basis	1 x 20 brusetbl	Postevand
Deferoxamin	Desferal	Jernforgiftning	500 mg	Pulver til inj/inf.	Htgl. 500 mg	Stuetemperatur	20 htgl.	Basis	10 htgl. à 500 mg	Sterilt vand
Diazepam	Diazepam, Stesolid m.fl.	Centralstimulantia, Chloroquin, AChE-hæmmere	5 mg/ml	Infektionsvæske eller emulsion	Amp. 2 ml	Stuetemperatur	25 amp.	Basis	25 x 2 ml	
Dimercaptopropansulfonat (DMPS)	Dimaval*)	Tungmetaller	50 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 5 ml	Stuetemperatur	40 amp.	Special	5 x 5 ml	
	Dimaval*)	Tungmetaller	100 mg	Kapsler	15 kpsl.	Stuetemperatur	90 kpsl.	Special	15 kpsl.	
Dimercaptoravsyre (Succimer/DMSA)	Succicaptal*)	Tungmetaller	200 mg	Kapsler	15 kpsl.	Stuetemperatur	45 kpsl.	Special	15 kpsl.	
Ethanol	Ethanol sterilfiltreret	Toksiske alkoholer	99 %	Infusionskoncentrat	Htgl. 100 ml	Stuetemperatur	6 htgl. 20 htgl.	Basis Special	1 x 100 ml	
Ferriferrocyanid	Berlinerblåt	Thallium, Cæsium		Oralt pulver	Pulver 4,5 g	Stuetemperatur	20 pulvere	Special	1 x 4,5 g	
Flumazenil	Flumazenil	Benzodiazepiner	0,1 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 5 ml	Stuetemperatur	20 amp.	Basis	5 x 5 ml	
Folininsyre	Calciumfolinat ELLER Bendafofin	Folinsyreantagonister, methanol	10 mg/ml	Infektionsvæske	Htgl. 10-100 ml	Køleskab	300 ml; Antal enheder afhænger af htgl. volumen	Basis	1 x 100 ml	
Fomepizolsulfat	Fomepizole EUSA Pharma *)	Toksiske alkoholer	5 mg/ml	Konc. til infusion	Amp. 20 ml	Stuetemperatur	150 amp.	Special	5 x 20 ml	Isotonisk glucose 55 mg/ml eller NaCl 9 mg/ml

Indholdsstof	Handelsnavn	Anvendelse	Styrke	Lægemiddelform	Enhed	Opbevaring	Minimal beholdning	Placering ^{II}	Mindste pakningsstørrelse	Solvens til inj. eller inf.
Glucagon	GlucaGen	Betablokere; Calciumantagonister	1 mg (1 IE)	Pulver og solvens til injektionsvæske	Opl. 1 mg	Køleskab, beskyt mod lys	10 htgl. + solvens	Basis	1-10 htgl	Solvens: Vand til inj.; Hvis inf., glucose 55 mg/ml
Glukokortikoid til inhalation	Flere produkter	Luftvejsirritanter	400 mcg/dosis	Inhalationspulver	100 doser	Stuetemperatur	5 x 100 doser	Basis	1 x 100 doser	
			0,5 mg/ml	Inhalationsvæske	Amp. 2 ml		40 amp.		20 x 2 ml	
Hugormegift antiserum	ViperatAb ^{*)}	Hugormegift	100 mg	Koncentrat til inf. væske	1 ampul 100 mg/4 ml	Køleskab	6 ampuller	Special	2 x 100 mg	NaCl 9 mg/ml
Hydroxycobalamin	Cyanokit	Cyanid	5 g	Pulver til inf. væske	1 htgl. 5 g	Stuetemperatur	3 htgl.	Basis	1 x 5 g	NaCl 9 mg/ml
	Cyanokit	Cyanid	5 g	Pulver til inf. væske	1 htgl. 5 g	Stuetemperatur	10 htgl.	Supplering	1 x 5 g	NaCl 9 mg/ml
	Cyanokit	Cyanid	5 g	Pulver til inf. væske	1 htgl. 5 g	Stuetemperatur	20 htgl.	Special	1 x 5 g	NaCl 9 mg/ml
L-Methionin	Methionin	Paracetamol	2,5 g	Pulver til oral opløsning	10 pulvere	Stuetemperatur	10 pulvere	Special	1 x 2,5 g	
Methylenblåt	Metylthioniniumchlorid Proveblue®	Methæmoglobinbindere	5 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 10 ml	Stuetemperatur	10 amp. à 10 ml	Basis	10 x 10 ml	Evt. glucose 50 mg/ml
Naloxon	Naloxon, Forvel m.fl.	Opioider	0,4 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 1 ml	Stuetemperatur	20 amp.	Basis	10 x 1 ml	Hvis inf. NaCl 9 mg/ml
Natriumpolystyrensulfonat	Resonium	Hyperkaliæmi		Pulver til oral/rektal suspension	Dåse 454 g	Stuetemperatur	1 dåse	Basis	1 x 454 g	Laktulose
Natriumsulfat	Natriumsulfat	Bariumforbindelser		Oralt pulver	Pulver 30 g	Stuetemperatur	1 pulver	Basis	1 x 30 g	
Obidoxim	Toxogonin ^{*)}	Acetylcholinesterase-hæmmere (AChE-inhib.)	250 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 1 ml	Stuetemperatur	400 amp.	Special	5 x 1 ml	
Penicillamin	Metalcaptase, Penicillamine, m.fl. ^{*)}	Kobberforgiftning	Styrke 150-300 mg/tbl	Tabletter	100 stk.	Stuetemperatur	100 tbl.	Special	2 x 100 tbl.	
Phentolamin	Phentolaminmesilat ^{*)}	Adrenerge agonister	10 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 1 ml	Køleskab	4 amp.	Basis	5 x 1 ml	
Physostigmin	Anticholium ^{*)}	Anticholinergika	0,4 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 5 ml	Stuetemperatur	10 amp.	Basis	5 x 5 ml	NaCl 9 mg/ml
Phytomenadion	Konakion Novum	Antikoagulantia (vit. K-antagonister), salicylater	10 mg/ml	Infektionsvæske	Amp. 1 ml	Stuetemperatur	5 amp.	Basis	5 x 1 ml	
Protamin	Protaminsulfat "Leo Pharma"	Overdosering af heparin	10 mg/ml	Inj./inf. væske	Amp. 5 ml	Stuetemperatur	1 amp.	Basis	5 x 5 ml	
Pyridoxinhydrochlorid	Pyridoxinhydrochlorid	Isoniazidforgiftning, gyrometrin (Stenmorkel)	25 mg/ml	Infektionsvæske	Htgl. 30 ml	Stuetemperatur	7 htgl.	Basis	10 x 30 ml	
Silibinin	Legalon SIL ^{*)}	Amatoksin	350 mg	Pulver til infusionsvæske	Htgl. 350 mg	Stuetemperatur	40 htgl.	Special	4 htgl. à 350 mg	Glucose 50 mg/ml eller NaCl 9 mg/ml
Thiosulfat	Natriumtiosulfat	Cyanid, iodspiritus	150 mg/ml	Infektionsvæske	Htgl. 100 ml	Stuetemperatur	6 htgl.	Basis	10 x 100 ml	

!!) Special (Speciallager/ Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital), Basis (Basislager/ alle skadestuer), Supplering (Suppleringslager/ et lager i hver region), SSI (Statens Serum Institut).

^{*)} Ikke registreret antidot; se Tilladelsespræparer. ^{**) Medicinsk udstyr. § Udleveres kun fra Statens Serum Institut (SSI).}